

Gebrauchsanweisung

DULCOSOFT DUO

Macrogol 4000, Simethicon
Pulver für Trinklösung

SANFTE LINDERUNG VON VERSTOPFUNG UND BLÄHUNGEN

WIRKT INNERHALB VON 24-72 STUNDEN

ZUCKER-, GLUTEN- UND LAKTOSEFREI, GESCHMACKSNEUTRAL

INHALTSSTOFFE

Macrogol 4000, Siliziumdioxid, Simethicon, Sucralose.

PACKUNG

DULCOSOFT DUO ist in einem 200 g-Behälter mit Messlöffel erhältlich.

WIRKUNGSWEISE

DULCOSOFT DUO ist ein Medizinprodukt mit folgenden Hauptbestandteilen:

1. **Macrogol** bindet das für die Einnahme verwendete Wasser und macht so den Stuhl weicher. Dies erleichtert den Stuhlgang und gibt Ihrem Körper ein natürliches Gefühl von Erleichterung.
2. **Simethicon** trägt dazu bei, das Gefühl von Blähungen zu verringern, indem es die Verteilung der in Magen und Darm eingeschlossenen Luft fördert.

INDIKATIONEN

DULCOSOFT DUO Pulver für Trinklösung wird zur symptomatischen Behandlung von Verstopfung, hartem Stuhl und Blähungen verwendet. Es:

- rehydriert und weicht harten Stuhl auf und trägt zu regelmässiger Darmentleerung bei;
- fördert den Abgang von Luft und verringert somit das Gefühl von Blähungen und Völlegefühl.

WARNHINWEISE

Es wird empfohlen, vor der Anwendung dieses Produkts bei einem Kind Ihren Arzt oder Ihre Ärztin zu fragen.

Die Anwendung bei Kindern muss unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.

Das Produkt darf nicht nach Ablauf des auf der Verpackung aufgedruckten Verfalldatums angewendet werden.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Packung geöffnet oder beschädigt ist.

Das Produkt kann die Darmpassagezeit verkürzen und so die Aufnahme oral verabreichter Medikamente verringern. Daher ist es ratsam, DULCOSOFT DUO in einem Abstand von mindestens 2 Stunden zu anderen oralen Arzneimitteln einzunehmen.

Bei unerwünschten Wirkungen beenden Sie die Anwendung des Produkts und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

KONTRAINDIKATIONEN

Wenden Sie DULCOSOFT DUO nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem oder mehreren Bestandteilen, Darmlähmung, Darmdurchbruch, Darmverschluss oder Verengung sowie schweren entzündlichen Darmerkrankungen (z. B. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, toxischem Megacolon) an.

Die Anwendung von Abführmitteln ist bei akuten Bauchschmerzen, Bauchschmerzen unbekannter Ursache, Übelkeit und Erbrechen, rektalen Blutungen unbekannter Ursache oder schwerer Dehydrierung kontraindiziert.

AUFBEWAHRUNG

Ausserhalb der Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

An einem trockenen, kühlen Ort sowie vor Licht und direkter Hitze geschützt aufbewahren.

Den Behälter nach Gebrauch fest verschliessen.

Das Verfallsdatum bezieht sich auf das korrekt aufbewahrte Produkt.

EINNAHME

Verwenden Sie den in der Packung enthaltenen Löffel, um das Pulver abzumessen: Der Löffel sollte locker gestrichen voll sein. Streichen Sie das überschüssige Pulver mit der stumpfen Kante eines Messers ab. Ein auf diese Weise befüllter Messlöffel entspricht etwa 4,5 g des Produkts.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: 2 bis 5 Messlöffel täglich.

Kinder zwischen 6 Monaten und 12 Jahren

- von 6 bis 10 kg: 1 Messlöffel täglich
- von 10 bis 15 kg: 1-2 Messlöffel täglich
- von 16 bis 43 kg: 2-4 Messlöffel täglich

Die Dosierung sollte je nach individuellem Ansprechen auf die Behandlung erhöht oder verringert werden, ohne die Maximaldosis von 4 Messlöffeln täglich bei Kindern bis 12 Jahren und 10 Messlöffeln täglich bei Kindern über 12 Jahren und Erwachsenen zu überschreiten.

Die richtige Dosis ist die niedrigste Dosis, die zu regelmässigem, weichem Stuhl führt.

Lösen Sie das Pulver in Wasser oder einem anderen Getränk (50 ml pro Messlöffel) auf und trinken Sie es umgehend.
Bei Einnahme der Mindestdosis (1 oder 2 Messlöffel täglich) wird empfohlen, das Produkt morgens anzuwenden. Bei höheren Dosierungen teilen Sie die Einnahme auf morgens und abends auf.
Stellen Sie nach einer Behandlung von 7 Tagen keine Verbesserung fest, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

DULCOSOFT DUO enthält keinen Zucker und ist daher für Diabetiker geeignet. Es kann bei Patienten mit kochsalzreicher Diät angewendet werden. Für eine Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit geeignet; in diesen Fällen ist es ratsam, vor der Anwendung Ihren Arzt oder Ihre Ärztin zu fragen.

NEBENWIRKUNGEN

Es kann zu Magen-Darm-Beschwerden (Bauchschmerzen, Blähungen, aufgeblähtem Bauch, Übelkeit und Stuhlinkontinenz) kommen. Durchfall ist eine Folge übermässiger Dosen DULCOSOFT DUO und kann durch eine Verringerung der Dosis vermieden werden. Selten wurde über Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschlag) nach der Anwendung von Produkten, die Macrogol enthalten, berichtet. Beenden Sie in diesem Fall die Anwendung des Produkts und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

Hersteller:



Biofarma, Via Castelliere 2
IT - Mereto di Tomba (UD)

Vertrieb:

BE: Sanofi Belgium, BE-1831 Diegem
AT: Sanofi-Aventis GmbH, Austria, A-1220 Wien
CH: Opella Healthcare Switzerland AG, CH-6343 Risch

Medizinprodukt  0373

Rev.: Januar 2021

