

# Tantills® JUNIOR

BEI AKUTEN HALSSCHMERZEN  
UND HALSENTZÜNDUNGEN

FÜR KINDER



## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Tantills® junior Halspastillen Medizinprodukt

#### Bei akuten Halsschmerzen und Halsentzündungen

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Sie haben sich mit **Tantills® junior Halspastillen** für ein Medizinprodukt entschieden, das Ihrem Kind bei akuten Halsschmerzen und Halsentzündungen hilft.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, sie enthält wichtige Informationen für Sie. Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf – vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Darüber hinaus berät Sie Ihr Arzt oder Apotheker.

#### Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet:

1. Was sind **Tantills® junior Halspastillen**?
2. Was ist in **Tantills® junior Halspastillen** enthalten?
3. Wofür werden **Tantills® junior Halspastillen** angewendet?
4. Wie sind **Tantills® junior Halspastillen** anzuwenden?
5. Welche unerwünschten Wirkungen sind möglich?
6. Was sollten Sie vor der Anwendung von **Tantills® junior Halspastillen** beachten?
7. Wie ist das Produkt aufzubewahren und wie lange ist es haltbar?
8. Weitere Informationen zu **Tantills® junior Halspastillen**

#### 1. Was sind **Tantills® junior Halspastillen**?

**Tantills® junior Halspastillen** sind Lutschpastillen zur lokalen Anwendung bei Halsschmerzen im Hals- und Rachenraum. **Tantills® junior Halspastillen** werden zur Behandlung von akuten Halsschmerzen, Halsentzündungen, Schluckbeschwerden, Heiserkeit und Halsbrennen angewendet.

**Tantills® junior Halspastillen** enthalten einen natürlichen, physikalisch wirksamen Komplex aus Eichenrindenextrakt und Glycerin. Diese einzigartige Kombination wirkt natürlich adstringierend (zusammenziehend) auf die angeschwollenen und entzündeten Schleimhäute und lässt diese wieder abschwellen.

Halsschmerzen werden gelindert und das Brennen in Hals und Rachen reduziert. Der befeuchtende Schutzfilm des Glycerins lindert Halsschmerzen und schützt die Schleimhäute vor dem Austrocknen.

#### 2. Was ist in **Tantills® junior Halspastillen** enthalten?

**Tantills® junior Halspastillen** enthalten einen natürlichen, physikalisch wirksamen Komplex aus Eichenrindenextrakt und Glycerin. Diese einzigartige Kombination verschafft durch seine abschwellende Wirkung Linderung bei Halsschmerzen, Halsentzündungen, Schluckbeschwerden, Heiserkeit und Halsbrennen.

Die hygroskopische Eigenschaft des Glycerins hat einen schleimhaut-einhüllenden Effekt, wodurch ein physikalisch wirksamer Schutzfilm entsteht. Dieser Film legt sich auf die geschädigte, entzündete Mund- und Rachenschleimhaut und unterstützt den natürlichen Heilungsprozess bei Halsentzündungen.

**Tantills® junior Halspastillen** enthalten: 22,5 mg Eichenrindenextrakt, pflanzliches Glycerin, Isomalt und Zitronensäure. Mit natürlichem Erdbeer Geschmack.

#### 3. Wofür werden **Tantills® junior Halspastillen** angewendet?

**Tantills® junior Halspastillen** werden bei Halsschmerzen und damit verbundenen Entzündungen und Schluckbeschwerden angewendet. **Tantills® junior Halspastillen** lindern akute Halsschmerzen mit typischen Symptomen wie Schluckbeschwerden und Schwellungen, sowie Entzündungen der Hals- und Rachenschleimhaut. **Tantills® junior Halspastillen** können entsprechend der Dosierung regelmäßig über den Tag verteilt gelutscht werden. Sie entfalten eine wohltuende Wirkung und Halsschmerzen werden gelindert.

#### 4. Wie sind **Tantills® junior Halspastillen** anzuwenden?

Verwenden Sie **Tantills® junior Halspastillen** immer gemäß der Gebrauchsanweisung. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

ALTER	DOSIERUNG
Für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene	Bis zu 6x täglich 1 <b>Tantills® junior Halspastille</b>

Die angegebene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Generell sollte darauf geachtet werden, dass Kinder die Fähigkeit des kontrollierten Lutschens bereits erworben haben.

#### Art der Anwendung

Es wird empfohlen **Tantills® junior Halspastillen** mehrmals täglich in einem Abstand von 2 – 3 Stunden anzuwenden. Bitte lutschen Sie **Tantills® junior Halspastillen** langsam bis zum vollständigen Auflösen, damit sich der Wirkkomplex vollständig entfalten und verteilen kann. Lutschen Sie die Pastillen nicht im Liegen, z.B. beim Einschlafen, da sonst die Gefahr des Verschluckens besteht. **Tantills® junior Halspastillen** sollten nicht zerkaut oder im Ganzen geschluckt werden.

## Gemeinsame Anwendung mit anderen Mitteln

Die gemeinsame Anwendung mit anderen Produkten, wie beispielsweise anderen Erkältungsmitteln oder Homöopathie ist möglich. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Medikamente (auch selbst gekaufte) anwenden. Nach der Einnahme von Medikamenten soll generell ein Zeitabstand von mindestens 1 Stunde eingehalten werden.

## Rechtzeitige Anwendung

Um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, sollten **Tantills® junior Halspastillen** bereits bei ersten Anzeichen von Halsschmerzen angewendet werden.

## Dauer der Anwendung

Das regelmäßige Lutschen von **Tantills® junior Halspastillen** ist für einen nachhaltigen Behandlungserfolg entscheidend. **Tantills® junior Halspastillen** können aufgrund der guten Verträglichkeit bei Bedarf auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Generell sollte die Behandlungsdauer mindestens 5 Tage betragen. Für einen nachhaltigen Behandlungserfolg empfiehlt es sich, auch nach Abklingen der Halsschmerzen die Behandlung mit **Tantills® junior Halspastillen** noch einige Tage fortzuführen, um einem erneuten Auftreten von Halsschmerzen entgegenzuwirken.

## 5. Welche unerwünschten Wirkungen sind möglich?

Aufgrund des Zuckerersatzstoffes Isomalt kann bei der Einnahme von zu großen Mengen eine abführende Wirkung auftreten.

Weitere unerwünschte Wirkungen sind bisher nicht bekannt. Falls Sie trotzdem unerwünschte Wirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

## 6. Was sollten Sie vor der Anwendung von Tantills® junior Halspastillen beachten?

**Tantills® junior Halspastillen** dürfen nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich oder allergisch auf einen der Bestandteile sind. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeit **Tantills® junior Halspastillen** nicht nochmals verwenden.

Dieses Medizinprodukt enthält Isomalt. Wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie an einer Unverträglichkeit gegenüber Isomalt leiden, wenden Sie dieses Produkt nicht an.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie an Krankheiten leiden oder Allergien haben. Wenn sich die Beschwerden spätestens nach einer Woche nicht gebessert oder sogar verschlechtert haben, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker konsultieren.

**Tantills® junior Halspastillen** enthalten einen natürlichen Wirkkomplex aus Eichenrindeneextrakt und Glycerin. Aufgrund des Pflanzenextraktes können die Lutschpastillen kleine farbige Einschlüsse aufweisen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die hochwertige Qualität und die Wirkung von **Tantills® junior Halspastillen**.

## 7. Wie ist das Produkt aufzubewahren und wie lange ist es haltbar?

Das Ablaufdatum von **Tantills® junior Halspastillen** ist auf der Verpackung und dem Blister aufgedruckt.

Verwenden Sie dieses Produkt nach dem angegebenen Ablaufdatum nicht mehr.

## Aufbewahrungshinweise



**Tantills® junior Halspastillen** trocken und nicht über 25°C lagern!



Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

## 8. Weitere Informationen zu Tantills® junior Halspastillen

### Darreichungsform

Lutschpastillen

### Packungsgröße

2 Blister à 12 Lutschpastillen (= 24 Stück)

### Stand der Information

April 2022



### Hersteller

MPC International S.A.  
26, Boulevard Royal  
2449 Luxembourg

### Vertrieb Österreich

KOSAN Pharma  
Anton-Bruckner-Str. 5  
4863 Seewalchen

Eine Marke der

**KOSAN PHARMA**



Apothekenexklusives  
Medizinprodukt

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr **Tantills® Team**

Tel: +43 7662 220 70-50

E-Mail: [info@tantills.at](mailto:info@tantills.at), [www.tantills.at](http://www.tantills.at)

## Kennen Sie schon?



**Tantills® Halspastillen** auch erhältlich für Erwachsene in den Geschmacksrichtungen **Blackcurrant** und **HoneyLemon**!