

Uporaba u trudnoći i/ili za vrijeme dojenja:
O uzimanju femidoc® UROEXPRESS® u trudnoći odnosno za vrijeme dojenja nisu priloženi nikakvi podatci. Ako ste trudni ili dojite, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog proizvoda.

⚠️ Pažnja:

- Nemjete upotrebljavati ovaj proizvod ako ste alergični na neki od sastojaka.
- Kod predoziranja mogu se pojaviti npr. nadutost, bolovi u trbuhi i proljev.
- Proizvod držite dalje od dohvata djece.
- U slučaju nuspojava prekinite uzimanje femidoc® UROEXPRESS®.
- Proizvod može uzrokovati ciklastu (crvenkasto-ružičastu) boju mokraće zbog pomoćne tvari ekstrakta cikle.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku:

- ako primijetite tragove krvi u urinu
- kod neprekidnih simptoma koji se nastavljaju 7 dana još eventualno pogoršaju
- ako već imate neko oboljenje ili uzimate neke druge lijekove
- kod simptoma upale mjeđuhara ili infekcije gornjeg mokraćnog sustava, kao npr. temperature od 38° ili više, nekontrolirane groznice, mučnine (podražaja na povraćanje), povraćanja odnosno proljeva. Može se dogoditi da bolujete od infekcije gornjeg mokraćnog sustava, koja zahtijeva posebno liječenje.
- ako ste u prošlosti već imali bubrežni kamenac.

Sastav: limunska kiselina, 2 g D-manoze, natrijev hidrogenkarbonat, kukuruzni škrob, cikla u prahu, sorbitol, ekstrakt šumskog voća, inulin, sukraloza.

Jedna šumeća tableta sadrži 2 grama D-manoze.

Ne sadrži alergene i primjeren je za vegane.

Sadržaj: 14 šumećih tableta.

 **Čuvanje:** Čuvajte na sobnoj temperaturi (5-25°C) na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju. Proizvod držite što dalje od dohvata djece.

 **Datum isteka roka uporabe:** femidoc® UROEXPRESS® ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Medicinski proizvod: femidoc® UROEXPRESS® medicinski je proizvod klase IIa prema Direktivi 93/42/EUropske ekonomske zajednice o medicinskim proizvodima.

Datum revizije upute: 2021.07.
076140V1.3

Distributer: InnoPharma d.o.o., Podružnica Zagreb za promidžbu, Savska cesta 41, Zagreb, info@innopharma.biz

 doc phytolabor guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG, Eduard-Bodem-Gasse 6, A-6020 Innsbruck, Austria doc@guterrat.net www.doclabor.hr

 PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

 0481

femidoc®
UROEXPRESS® **FIZZ**

 Az E. coli által okozott visszatérő húgyúti fertőzések/húgyagylladások megelőzésére szolgál. Támgatja a húgyúti fertőzések kezelését.

Javaslat:
Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, mielőtt alkalmazni kezdi a femidoc® UROEXPRESS®-t, még akkor is, ha korábban már használta ezt az orvostechnikai eszközt. Az információ módosulhatott az új kutatások és adatok alapján az utolsó csomag felbontása óta eltelt időben. Tartsa meg a használati útmutatót, a későbbiekben még szüksége lehet rá.

Alkalmazás: A femidoc® UROEXPRESS® az E. coli által okozott húgyúti fertőzések kezelésének támgatására, valamint a visszatérő húgyúti fertőzések (húgyagylladás) elleni védelemre szolgál.

A húgyagylladás tünetei a következők:

- Égő vagy fájdalmas érzés vizeletűrités közben
- Vizelési inger
- A húgyhólyag gyakori ürítése
- Hasi fájdalom.

Kérjük, keresse fel gyógyszerészét vagy kezelőorvosát, ha húgyagylladás tüneteit észleli.

Adagolás és alkalmazás felnőtteknek 18 éves kortól:

Megelőzés céljából naponta egyszer 1 pezsgőtabletta kell elfogyasztani. A kezelés támgatására naponta kétszer 1 pezsgőtabletta kell elfogyasztani. Oldja fel a pezsgőtablettát egy polár-

vízben (200 ml). Azonnal fogyassza el. Szájon át történő alkalmazásra. Ne lépjé túl az ajánlott napi adagot.

Az alkalmazás időtartama:

A femidoc® UROEXPRESS® egy kezelési perióduson belül legfeljebb 30 napon át használható. A kezelés 4 nápos szünet után folytatható.

Hogyan működik?

Hatóanyaga a D-manoz. A D-manoz természetesen előfordul az emberi anyagcsereben. A D-manoz az E. coli baktériumokhoz tapad, ezzel megakadályozza, hogy a baktériumok megtelepedjenek a húgyutak falán. Így a baktériumok egyszerűen kiürülnek a szervezetből vizeletűrités közben.

Mellékhatások:

A femidoc® UROEXPRESS® jól tolerálható, és kevés mellékhatás van. Az egyik lehetséges mellékhatás a hasmenés; ez azonban ritkán fordul elő.

Alkalmazás terhesség és/vagy szoptatás idején:

Nem általános rendelkezésre adatok a femidoc® UROEXPRESS® terhesség vagy szoptatás alatti alkalmazására vonatkozóan. Mielőtt ezt a terméket terhesség, ill. szoptatás idején alkalmazná, kérjük, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

⚠️ Figyelmeztetések:

- Ne használja a terméket, ha bármely összetevőre allergiás.
- Túladagolás esetén olyan tünetek jelentkezhetnek, mint puffadás, hasi fájdalom és hasmenés.
- Kisgyermekkel elől elzárva tartandó.
- Ha bármilyen nem kívánt reakciót észlel, hagyja abba a femidoc® UROEXPRESS® szedését.
- A készítmény beeturiát (a vizelet vörös/rózsaszín elszíneződését) okozhat a céklakivonat segédanyag miatt.

Kérjük, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez, ha:

- vérnyomokat észlel a vizeletben.
- a tünetek továbbra is fennállnak, és 7 nap után esetleg még súlyosbodnak.
- egyéb egészségügyi problémája is van vagy egyéb gyógyszereket szed.
- húgyagylladásra vagy felső húgyúti fertőzésre utaló tünetei vannak, mint például 38°C-os vagy magasabb láz, csillapíthatatlan láz/hidegrázás, rosszullét (hányinger), hányás vagy hasmenés. Lehet, hogy felső húgyúti fertőzése van, ami speciális kezelést igényel.
- Önnek korábban vesekőve volt.

Összetétel: citromsav, 2 g D-manoz, nátrium-hidrogén-karbonát, kukorica-keményítő, céklapor, szorbit, erdei gyümölcs aroma, inulin, sukralfáz.

Pezsgőtablettánként 2 g mannózt tartalmaz.

Nem tartalmaz allergéneket, vegánok és vegetáriánusok is alkalmazhatják.

Tartalom:

14 db pezsgőtableta

 **Tárolás:** Szobahőmérsékleten (5-25 °C), száraz, sötét helyen, az eredeti csomagolásban tárolandó. Kisgyermekkel elől elzárva tartandó.

Lejárat iídő:

Semmiéppen nem javasoljuk a femidoc® UROEXPRESS® alkalmazását a csomagoláson feltüntetett dátum után.

Orvostechnikai eszköz:

A femidoc® UROEXPRESS® az orvostechnikai eszközököről szóló 93/42/EGK európai irányelv szerint II.a osztályba sorolt orvostechnikai eszköz.

A használati útmutató legutóbbi felülvizsgálatának időpontja: 2021.07. 076140V1.3

Magyarországon forgalmazza:
Pharmanext Kft., 1085 Budapest, Stáhly utca 2/A., info@pharmanext.hu

 doc phytolabor guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG, Eduard-Bodem-Gasse 6, A-6020 Innsbruck, Austria doc@guterrat.net www.uroexpress.hu

 PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, Hollandia

 0481

femidoc®



UROEXPRESS® FIZZ

HARNWEGSINFJEKTIONEN / ZYSTITIS

HÚGYÚTI FERTŐZÉSEK / HÓLYAGHURUT

INFEKCIJA MOKRAĆNOG SUSTAVA / CISTITIS

VNETJE SEČNEGA MEHURJA / CISTITIS



BRAUSETABLETTEN
PEZSGŐTABLETTA
ŠUMEČIH TABLET
ŠUMEČIH TABLETA

KLINISCH GEPRÜFT
KLINIKAILAG BIZONYÍTOTT
KLINIČKI PROVJERENO
KLINIČNO PREVERJENO



doc®
phytolabor

Dient zur Prävention von durch E.coli verursachten wiederholt auftretenden Harnwegsinfektionen / Blasenentzündungen. Unterstützt die Behandlung von Harnwegsinfektionen.

Empfehlung: Vor der Einnahme von femidoc® UROEXPRESS® die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen, auch wenn Sie dieses Medizinprodukt vorher schon einmal eingenommen haben. Es kann sein, dass sich die Informationen in der Zwischenzeit, seit Sie Ihre letzte Packung geöffnet haben, gemäß den neueren Forschungsergebnissen und Befunden geändert haben. Dieses Medizinprodukt ist nicht verschreibungspflichtig.

Anwendung: femidoc® UROEXPRESS® dient zur Unterstützung der Behandlung von durch E. coli verursachten Harnwegsinfektionen in der Blase sowie zum Schutz vor wiederholt auftretenden Harnwegsinfektionen (Blasenentzündungen).

Verwendung während der Schwangerschaft und/oder Stillzeit: Über die Einnahme von femidoc® UROEXPRESS® während der Schwangerschaft beziehungsweise Stillzeit liegen keine Daten vor. Bevor Sie dieses Produkt während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Symptome einer Blasenentzündung sind:

- Ein brennendes oder schmerhaftes Gefühl bei der Harnentleerung
- Harndrang
- Häufige Blasenentleerung
- Bauchschmerzen.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker oder Hausarzt, wenn Sie an den Symptomen einer Blasenentzündung leiden.

Dosierung und Verwendung, Erwachsene und Kinder ab 18 Jahren: Zur Prävention wird einmal täglich je 1 Brausetablette eingenommen. Zur Unterstützung der Behandlung nimmt man zweimal täglich je 1 Brausetablette. Die Brausetablette in einem Glas Wasser (200 ml) auflösen. Sofort ganz austrinken. Zur oralen Verwendung. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Anwendungsdauer: femidoc® UROEXPRESS® darf innerhalb einer Behandlungsperiode höchstens 30 Tage lang eingenommen werden. Nach 4 Tagen Pause kann die Behandlung wieder aufgenommen werden.

Wie funktioniert es?
Der Wirkstoff ist D-Mannose. D-Mannose kommt von Natur aus im menschlichen Stoffwechsel vor.

D-Mannose haftet an E. coli Bakterien an und verhindert somit, dass sich die Bakterien an den Wänden der Harnwege absetzen. Daraufhin werden die Bakterien ganz einfach beim Wasserklassen aus dem Körper ausgespült.

Nebenwirkungen:

femidoc® UROEXPRESS® ist gut verträglich und hat wenig Nebenwirkungen. Eine mögliche Nebenwirkung ist Durchfall, dies kommt jedoch nur selten vor.

Verwendung während der Schwangerschaft und/oder Stillzeit:

Über die Einnahme von femidoc® UROEXPRESS® während der Schwangerschaft beziehungsweise Stillzeit liegen keine Daten vor. Bevor Sie dieses Produkt während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Achtung:

- Das Produkt nicht verwenden, wenn Sie gegenüber einem der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Bei Überdosierung können Beschwerden auftreten, beispielsweise Blähbauch, Bauchschmerzen und Durchfall.
- Darf nicht in die Hände von kleinen Kindern gelangen.
- Bei Unverträglichkeitsreaktionen mit der Einnahme von femidoc® UROEXPRESS® aufhören.
- Das Produkt kann Beeturie (rote/rosa Verfärbung des Urins) aufgrund des Hilfsstoffes Rote-Bete-Extrakt verursachen.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker:

- Wenn Sie Blutspuren im Urinfeststellen.
- Bei anhaltenden Symptomen, die sich nach 7 Tagen eventuell noch verschlimmern.
- Wenn Sie bereits eine Erkrankung haben oder andere Medikamente einnehmen.
- Bei Symptomen einer Blasenentzündung oder einer Infektion der oberen Harnwege, wie beispielsweise 38°C oder höherer Fieber, unkontrollierbaren Fieberschauern/Schüttelfrost, Übelkeit (Brechreiz), Erbrechen beziehungsweise Durchfall. Es kann sein, dass Sie an einer Infektion der oberen Harnwege leiden, die einer speziellen Behandlung bedarf.
- Wenn Sie in der Vergangenheit schon einmal Nierensteine gehabt haben.

Zusammensetzung: Zitronensäure, 2 g D-Mannose, Natriumhydrogencarbonat, Maisstärke, Rote-Bete-Pulver, Sorbitol, Wildbeerenextrakt, Inulin, Sucralose.

Jede Brausetablette enthält 2 Gramm D-Mannose.

Enthält keine Allergene und ist für Vegetarier und Veganer geeignet.

Inhalt: 14 Brausetabletten.

Aufbewahrung:

Bei Raumtemperatur (5 – 25 °C) an einem trockenen, dunklen Ort in der Originalverpackung aufbewahren. Das Produkt darf nicht in die Hände von kleinen Kindern gelangen.

Verfalldatum: Verwenden Sie femidoc® UROEXPRESS® keinesfalls nach dem auf der Verpackung angegebenen Datum.

Medizinprodukt:

femidoc® UROEXPRESS® ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Europäischen Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte. Letzte Überarbeitung dieser Gebrauchsanweisung im Juli 2021 076140V1.3

 doc phytolabor
guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG,
Eduard-Bodem-Gasse 6,
A-6020 Innsbruck, Österreich
doc@guterrat.net
www.dclabor.com

 PK Benelux BV, Vluchtoord 17,
5406 XP Uden, NL

vnetjem sečil (vnetjem mehurja).
Simptomi vnetje mehurja so:

- bolečina in pekoč občutek med uriniranjem,
- pogost občutek siljenja na vodo (pritisk),
- pogosto uriniranje,
- bolečine v trebuhi.

Če imate navedene simptome, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Odmerjanje in uporaba za odrasle:

Za pomoč pri zdravljenju – dvakrat na dan po eno šumečo tableto. Za preprečevanje – eno šumečo tableto na dan. Šumečo tableto raztopite v kozarcu vode (200 ml), in takoj popijte. Samo za oralno uporabo. Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoracičiti.

Trajanje terapije:

femidoc® UROEXPRESS® lahko jemljete največ 30 dni. Nato prekinite jemanje. Po 4 dneh lahko nadaljujete s terapijo.

Kako deluje:

Aktivna sestavina je D-manoza. Ta je naravno prisotna v človeškem metabolizmu. D-manoza se veže na bakterije E. coli in preprečuje njihovo pritrdiritev na stene urinarnega trakta. Nato se bakterije enostavno, z vodo (uriniranjem), izperejo iz telesa.

Neželeni učinki: femidoc® UROEXPRESS® se dobro prenaša in ima zelo redke neželeni učinki. Eden možnih neželenih učinkov je driska, vendar je zelo redka.

Uporaba v nosečnosti in med dojenjem:

O jemanju femidoc® UROEXPRESS® v nosečnosti oziroma med dojenjem ni podatkov. Če ste noseči ali dojite, se o uporabi posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Opozorilo:

- Ne uporabljajte, če ste alergični na katero od sestavin.
- Ob prekoracitvi odmerka se lahko pojavijo npr. napihnjenost, bolečine in driska.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom.
- Ob neželenih učinkih prekinite jemanje izdelka femidoc® UROEXPRESS®.
- Uživanje lahko povzroči rdečkasto rožnato barvo urina zaradi pomožne snovi izvlečka rdeče pese.

Uporaba:

femidoc® UROEXPRESS® se uporablja

kot pomoč pri zdravljenju okužb sečil/ mehurja, ki jih povzroča bakterija E. coli, pa tudi kot zaščita pred ponovnim

Posvetujte se s svojim zdravnikom ali farmacevtom, če:

- opazite sledi krvi v urinu,
- imate neprekjene simptome, ki se po 7 dneh še poslabšajo,
- že imate neko bolezen ali jemljite druga državila,
- imate simptome okužbe mehurja ali okužbo zgornjih sečil, kot npr. temperatura 38 °C, neobvladljive mrzlice, slabost (siljenje na bruhanje), bruhanje oziroma driska; lahko se zgodi, da imate vnetje zgornjih sečil, kar zahteva posebno zdravljenje,
- ste imeli v preteklosti ledvične kamne.

Sestavine: citronska kislina, D-manoza, natrijev hidrogenkarbonat, koruzni škrob, prah rdeče pese, sorbitol, izvleček goznih sadežev, inulin, sukalzo.

Ena šumeča tableta vsebuje 2 grama D-manoze.

Ne vsebuje alergenov in je primeren za vegane.

Vsebina: 14 šumečih tablet.

 **Shranjevanje:** Shranjujte pri sobni temperaturi (5–25 °C) na suhem in temnem mestu v originalni embalaži. Hraniti nedosegljivo otrokom.

Uporabnost:

femidoc® UROEXPRESS® se ne sme uporabljati po izteku roka uporabe, navedenega na ovojnini.

Medicinski pripomoček:

femidoc® UROEXPRESS® je medicinski pripomoček razreda IIa skladno z evropsko direktivo 93/42 o medicinskih pripomočkih.

Zadnja revizija navodila V1.3: 2021.07.076140V1.3

Distributer: InnoPharma d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana, info@innopharma.biz

 doc phytolabor
guterrat Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG,
Eduard-Bodem-Gasse 6,
A-6020 Innsbruck, Avstrija
doc@guterrat.net
www.dclabor.com

 PK Benelux BV, Vluchtoord 17,
5406 XP Uden, NL

(R) Pomaže pri liječenju infekcije mokraćnih kanala. Za prevenciju učestalih infekcija mokraćnih kanala / upale mjhura uzrokovane bakterijom E. coli.

Preporuka: Prije uporabe femidoc® UROEXPRESS® pažljivo pročitajte uputu, čak i ako ste već prije uzimali ovaj proizvod. Moguće je da su se informacije u međuvremenu, od vaše zadnje uporabe ovoj proizvoda, a uslijed najnovijih rezultata istraživanja i nalaza, promjenile. Ovaj medicinski proizvod izdaje se bez recepta.

Uporaba: femidoc® UROEXPRESS® upotrebljava se kao pomoć pri liječenju infekcije mokraćnih kanala uzrokovane bakterijom E. coli te kao zaštita od ponovne upale mokraćnih kanala (upale mjhura).

Simptomi upale mjhura su:

- osjećaj boli i peckanje pri mokrenju
- čest osjećaj potrebe za mokrenjem (pritisak)
- učestalo mokrenje
- bolovi u trbuhi.

Ako imate bilo koji od navedenih simptoma, obratite se svom ljekarniku ili liječniku opće prakse.

Doziranje i uporaba za odrasle:

Kao pomoć pri liječenju uzima se po jedna šumeča tableta dva puta dnevno. Kao prevencija uzima se jedna šumeča tableta dnevno. Šumeču tabletu otopite u časi vode (200 ml) in odmah popijte. Za oralnu uporabu: ne smije se prekoracičiti preporučena dnevna doza.

Duljina trajanja terapije: Tijekom terapije femidoc® UROEXPRESS® smije se uzmati najviše 30 dana. Nakon 4 dana pauze, terapija se može ponoviti.

Kako funkcioniра?

Aktivna tvar je D-manoza. Prirodno je da se D-manoza pojavljuje u ljudskom metabolizmu. D-manoza se veže na bakterije E. coli i tako sprječava njihovo taloženje na stijenkama mokraćnih kanala. Nakon toga bakterije se jednostavno vodom (mokrenjem) izlučuju iz tijela.

Nuspojave: femidoc® UROEXPRESS® dobro se podnosi i ima vrlo rijetke nuspojave. Moguća nuspojava je proljev, što se ipak vrlo rijetko događa.